



Акробат® МЦ

Непревзойденная классика



Универсальный, комбинированный фунгицид для защиты картофеля, ягодных и овощных культур от комплекса болезней

Преимущества фунгицида

- Одновременно защищает картофель от фитофтороза и обеспечивает базовую защиту от альтернариоза.
- Надежно защищает картофель от всех форм фитофтороза (листовой, стеблевой) и предотвращает заражение клубней.
- Контролирует заболевания на многих стадиях развития патогенов: предотвращает прорастание спор, купирует проникший в растение мицелий гриба и останавливает спороношение.
- Широкая сфера применения на картофеле, клубнике и овощных культурах от фитофтороза, альтернариоза, пероноспорных патогенов и других заболеваний.
- Отсутствие резистентности к компонентам препарата за всю историю применения (в том числе перекрестной, с препаратами из группы фениламинов и др.).
- Акробат® МЦ, в дозировке 2 кг — содержит 30 г/га Zn⁺⁺ и 240 г/га Mn⁺⁺ в доступной для растений форме.

Характеристика препарата

Действующие вещества

Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)

Механизм действия

Код 40 + M3, FRAC*

Температура хранения

-10...+30°C

Гарантийный срок хранения

Не менее 3 лет

Распределение в растении

Локально-системный, трансламинарный (диметоморф) + контактный (манкоцеб)

Препаративная форма

Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Период защитного действия

10–14 суток

Упаковка

1 x 10 кг

* Механизм действия согласно Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Регламент применения

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработки)
Картофель	2,0	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5%-ной суспензией препарата. Первая обработка профилактическая — по прогнозу, последующие — с интервалом 10–14 дней	20 (3)
Огурец (семенные посевы)	2,0	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	— (5)
Томат открытого грунта	1,5	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации 0,2%-ным рабочим раствором: первая обработка — при первых признаках появления болезни; последующие — с интервалом 10–14 дней	20 (3)
Томат защищенного грунта	2,0			3–5 (3)
Лук репчатый (кроме лука на перо)	2,0	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка — профилактическая, последующие — при появлении первых признаков болезни с интервалом 10–14 дней	28 (3)
Клюква крупноплодная	2,0	Годрония, гибберовая пятнистость листьев, монилиальный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, суховершинность побегов	Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок	74 (4)

Рекомендации по применению

Акробат® МЦ, в дозировке 2 кг/га, применяется для первых профилактических обработок картофеля до смыкания ботвы в рядках для контроля скрытой (латентной) инфекции и профилактической защиты от заражения фитофторозом и альтернариозом.

Для продолжительной защиты от фитофтороза рекомендуется последовательное применение фунгицидов Акробат® МЦ и Орвего® с интервалом между обработками 10–14 дней.

На высоковосприимчивых к альтернариозу сортах картофеля Акробат® МЦ и Орвего® следует применять совместно с фунгицидом Пиктор® Актив 0,3 л/га, Ревииона®, 1,0 л/га.