

# Делан® Сделан специально для плодовых



#### Надежный контактный фунгицид для защиты плодово-ягодных культур от болезней

## Преимущества фунгицида

- Хорошая прилипаемость и устойчивость к смыванию осадками.
- Эффективно применение после повреждения плодов градом.
- Возможно применение на всех фазах развития культуры.
- Не вызывает образования сетки на плодах даже при многократном применении.
- Практически не опасен для пчел и полезных насекомых.
- Основа антирезистентной стратегии борьбы с болезнями.

# Характеристика препарата



Действующее вещество

Дитианон (700 г/кг)



Код M9. FRAC\*



Не выше +40°C



Не менее 5 лет

**Г** Распределение в растении

Контактный

Препаративная форма

Водорастворимые гранулы (ВГ)

Период защитного действия

5-14 дней



**У**паковка

4 x 5 KF

### Регламент применения

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработки)
Яблоня, груша	0,5-0,7	Парша	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1500 л/га	20 (6)
Клюква крупноплодная	0,5-0,7	Монилиоз, плодовые гнили, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации	70 (6)
Слива	0,7	Клястероспориоз, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации в системе защиты сада: 1-е — в конце цветения, 2-е — в период роста плодов	39 (2)

#### Рекомендации по применению

- Обработки препаратом Делан® могут проводиться как в прямой последовательности, так и чередоваться с системными препаратами (Строби®, Серкадис®, Серкадис® Плюс, пириметанил, ципродинил, дифеноконазол и др.).
- Делан® совместим в баковой смеси с большинством фунгицидов и инсектицидов компании BASF. В каждом конкретном случае необходимо провести тест на совместимость.
- Не следует проводить обработки в смеси с маслами и маслосодержащими препа-
- Эффективен при температуре от +5 °C против широкого спектра возбудителей болезней. Проявляет эффективность и при более низких температурах, однако применение препарата следует проводить днем при повышении температуры от +5 °C и выше.

Для профилактики выработки резистентности и в случае прошедших осадков до планируемого применения контактных фунгицидов: Делан<sup>®</sup> или Полирам<sup>®</sup> ДФ в системах защиты сада рекомендуем баковые смеси:

При дневных температурах +7...+22 °C:

При дневных температурах +7...+25 °C:



Серкадис® 0.25 л/га



Делан<sup>®</sup> Полирам<sup>®</sup> ДФ 0.5 кг/га 2.25 кг/га



Строби® 0.15 кг/га



Делан<sup>®</sup> Полирам<sup>®</sup> ДФ 0.5 кг/га 2.25 кг/га

<sup>\*</sup> Механизм действия согласно Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)