

# Нопасаран® Флекс

Время выдохнуть!

НОВИНКА

 Clearfield/ Чистое поле®  
Производительная система для рапса

Надежная защита от сорняков с новым трехкомпонентным решением в линейке гербицидов Clearfield®

## Преимущества гербицида

- Контроль максимально возможного спектра сорной растительности.
- Сохранность урожая и качества масла.
- Оптимизация Ваших инвестиций.
- Управление временем.

## Характеристика препарата

### Действующие вещества

Имазамокс, 17,5 г/л + квинмерак, 75,0 г/л + аминопиралид, 4,0 г/л

### Механизм действия

Группа 2 + 4 + 4\*

### Температура хранения

-5...+40 °C

### Гарантийный срок хранения

2 года

### Распределение в растении

Системное

### Препаративная форма

Водорастворимый концентрат (ВРК)

### Период защитного действия

В течение всего периода вегетации

### Упаковка

2 x 10 л

## Регламент применения

| Культура  | Норма расхода, л/га | Вредный объект                   | Способ, время обработки, ограничения  | Срок ожидания (кратность обработки) |
|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Рапс яровой и озимый (КЛ или CL гибриды рапса CLEARFIELD) | 1,4-1,6             | Однолетние двудольные и злаковые | Опрыскивание в фазу 2 – 4 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков | — (1)                               |
| Рапс озимый* (КЛ или CL гибриды рапса CLEARFIELD)         | 1,4-1,6             |                                  | Опрыскивание посевов весной до фазы скрытого бутона                                 | — (1)                               |

\* расширение регистрации ожидается в 2025

## Рекомендации по применению

- Применять только в посевах рапса производственной системы Clearfield®, устойчивых к гербицидам линейки Нопасаран®.
- Основная рекомендуемая норма расхода Нопасаран® Флекс – 1,6 л/га в фазу 2 – 4 листа культуры и сорных растений.
- В фазу 1–2 листьев рапса (семядоли — 2 листа сорняков) на легких почвах и полях с малым количеством сорной растительности предлагается снижение нормы расхода Нопасаран® Флекс до 1,4 л/га.
- Гербицид Нопасаран® Флекс следует применять в период активного роста сорняков (двудольные и злаковые сорные растения, а также палалица зерновых не должны перерастать фазу 4 листьев), который совпадает с фазой 2–4 листьев культуры.
- Гибкость в сроках внесения препаратов дает возможность совместного применения с фунгицидами – регуляторами Оптимо® Дуо, Карамба®, морфорегуляторами с фунгицидным действием Карамба® Турбо и Архитект®, а также с инсектицидом Фастак® при совпадении сроков внесения в фазу 3–4 листьев рапса.
- Избегать применения, если ожидается дождь в ближайший час.
- Избегайте эффекта затенения – крупные листья рапса прикрывают сорные растения и почву, что может повлиять на эффективность применения гербицида.
- При применении гербицидов семейства Нопасаран® необходимо руководствоваться фазой развития сорных растений, а не растений рапса.

Как отличить гибрид рапса производственной системы Clearfield®?

В торговом названии гибрида есть аббревиатура **КЛ** или **CL**:  
например ИнВ1266 КЛ.

\* Механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)